ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Coup de pied de Cheval au pubis Mortel en peu d'heures.

Un Garçon jeune et robuste passant derriere un cheval de Rouiller qui mangeoit l'avoine en recut sur le pubis un coup de pied qui ecrasa pour ainsi dire ce Garçon contre une porte qui etoit proche. il ressentit à l'instant la plus vive douleur et tomba par terre on le porta au lit. Je ne pus le voir que deux heures aprés l'accident pour toute trace exterieure du Coup je n'apperçus qu'une legere rougeur au Coté droit de la Symphise du pubis, sans enflure et peu douloureuse au toucher le bas ventre entier etoit trés douloureux; le blessé qui n'avoit cessé de se plaindre n'avoit pas changé la position ou on l'avoit mis et paroissoit dans l'impossibilité de mouvoir les Extremités inferieures il etoit huit heures du soir; on lui fit deux saignées dans la nuit et on appliqua sur le pubis et l'abdomen une fomentation resolutive on ne donna point un Lavement que j'avois conseillé. le lendemain à sept heures du matin le malade etoit au plus mal, les douleurs étoient les mêmes le pouls etoit aneanti, la tête trés saine mais le tronc et les extremités froides. ~~il fut~~ le malade fut administré et mourut deux heures aprés.

L'inspection anatomique du Cadavre ne me fit voir qu'un peu de sang extravasé dans le tissu cellulaire à l'endroit du Coup. tous les viscéres du Bas ventre étoient dans l'etat le plus naturel excepté une petite portion de l'intestin Ileum qui étoit legerement phlogosée.

Les Exemples de Morts promptes et même subites à la suite de Coups reçus au Bas ventre ne sont pas infiniment rares

ARC 56 n° 101

quoique l'ouverture des Cadavres n'ait laissé appercevoir aucune lésion interieure capable de l'avoir procurée. Les exemples d'un coup porté au pubis devenu mortel en aussi peu de tems, ne sont peut être pas fequens c'est ce qui m'a determiné a en faire part. l'état naturel en apparence où j'ai trouvé les viscères de l'abdomen ne laisse guerres matiere aux Conjectures. S'il ne m'a pas été possible d'empescher la Mort de ce blessé il ne m'est pas plus facile d'imaginer quelle peut en avoir été la Cause : peut-être quelqu'un serat-il plus heureux.

Observation

Des effets d'un coup des deux pieds de derriere d'une Mule portés sur l'aine

L'hydrocele soit du Cordon des vaisseaux Spermatiques soit du Testicule ~~fut~~ est pour l'ordinaire une maladie qui vient lentement et du genre des Chroniques. L'observation suivante en fait voir une d'une espece aigue et l'effet prompt d'une rupture subite des vaisseaux limphatiques et sereux du tissu cellulaire du Cordon des vaisseaux Spermatiques accompagnée d'un depôt purulent dans la region Iliaque droite et d'un épanchement de sang dans le tissu cellulaire de la partie inferieure du Scrotum. Voici le fait.

Un jeune homme de 25 a 30 ans garçon Meunier du Moulin de Barbé, à une demie lieue de Cette Ville, passoit derriere sa mule pour la Charger lorsqu'une femme sortant de la maison à la porte de laquelle étoit attachée la Mule, fit peur a cet animal

qui porta au garçon qui etoit derriere un coup des deux pieds et
le renversa. Ce garçon fut porté au Moulin ou il resta cinq jours
sans qu'on lui fit aucun remede. on l'apporta à L'hotel-Dieu. —
Je trouvai dans L'aine et le Scrotum du coté droit une tumeur
Considérable très douloureuse très tendue depuis l'aineau jusqu'au bas
du Scrotum sans changement de couleur a la peau et dans la quelle on ne distinguoit pas le Testicule. —
cette tumeur au Coup d'œil avoit L'air d'une oschéocèle etranglée.
mais elle etoit accompagnée de Symptomes differens. il y avoit
audessus de L'aineau un engorgement egalement douloureux qui
occupoit toute la region Iliaque et une partie de L'hypogastrique
la fievre etoit violente, le Malade n'avoit point pris de Someil
depuis l'accident. les Saignées, la diette, les lavemens, les Cataplasmes,
et fomentations emollientes furent sur le champ et de suite mis en
usage. rien pendant 5 a 6 jours ne changea l'etat du malade
ni de la tumeur. au bout de ce tems je crus sentir de la fluctuation
dans la tumeur qui avoit un peu augmenté sans changer de Couleur.
cette fluctuation se faisoit sourdement sentir de la tumeur à la partie
la plus élevée de L'engorgement de L'abdomen. j'imaginai que ce
depôt effet d'une percussion violente etoit en grande partie
sanguin. J'en fis l'ouverture en fendant d'abord la peau et
le tissu cellulaire depuis L'aineau Jusques vers le bas du Scrotum
J'apperçus alors une espece de Sac dans lequel je plongeai le
Bistouri. cette petite ouverture donna une issue vive a plus d'une
chopine d'une Serosité de Couleur blanchatre dans la quelle
nageoient de tres petits floccons purulens. je fendis ce Sac depuis

Lanneau jusquau testicule que je rencontrai a la partie inferieure de ce sac Mais audessous du testicule etoit un autre depôt dont jaurois bien desiré joindre louverture à celle que je venois de pratiquer ce que je ne pouvois faire en prolongeant celle ci sans interresser le testicule. ~~Jen~~ en passant le doigt dans le tissu cellulaire derriere et a coté de cet organe jarrivai au depôt qui ne toit formé que par du sang epanché tombé en dissolution. Jen procurai levacuation en comprimant son foyer et depuis cet instant ce foyer a disparu.

Jusqualors il netoit rien sorti du depôt superieur, Je comprimai la region Iliaque cette Compression fit sortir par Lanneau beaucoup dun pus tres epais et tres fœtide d'odeur de cafe. Je pansai Mollement. le malade dormit dans la nuit. le lendemain ~~[illegible]~~ il ne souffroit point et il etoit sans fievre. Lissue du pus par lanneau fut encore abondante en comprimant labdomen. le pansement fut fait avec le digestif. apres quelques pansemens le pus du depôt ne sortoit plus quavec beaucoup de difficulte et a force de pressions, il paroissoit plus acre de plus mauvaise odeur, il etoit plus fluide et le foyer qui le contenoit ne paroissoit pas avoir perdu de son etendue; les bords du sac de Lhydrocelle setoient eleves et rapproches on nen pouvoit panser le fond quavec beaucoup de peine le Kiste avoit bruni et paroissoit prendre de la consistence. cet etat de la playe et du depôt exigeoit quon procurât une issüe plus libre au pus Le pus sortoit a travers Lanneau cetoit donc lui quil falloit dilater et cetoit dailleurs le lieu le plus declive. Jy cherchai longtems le chemin qui conduisoit au foyer, tant il etoit resserré Je parvins enfin à y faire passer un stilet que je portai jusqua la hauteur de

l'épine superieure de l'os des Iles et de l'ombilic dans l'espace moyen entre ces deux parties. J'y ~~glissai~~ ensuite une sonde crenelée sur laquelle je portai un bistouri et je fendis l'anneau et les tegumens suffisamment pour donner une issue libre au pus et pouvoir avec facilité panser le fond de ce foyer très étendu. il sortit par cette ouverture une grande quantité de pus epais et très fetide. Je portai dans le foyer quelques bourdonnets liés. l'ouverture fut tamponée pour arrêter le sang d'une petite artere ouverte vers l'angle superieur de la playe.

Le malade avoit été sans fièvre depuis la premiere incision; la seconde n'en fit pas naitre. les premiers pansemens furent faits avec des bourdonnets liés trempés dans le digestif; on les supprima ensuite pour faire des injections detersives qu'on portoit avec une sonde a femme. Dès le premier pansement après cette ouverture la playe du scrotum parut plus belle, les parrois du Kiste de resserrés ~~et~~ durs et elevés par les bords avoient commencé a s'eloigner à s'affaisser et à s'amollir, il sembloit que les parties qui le formoient etranglées auparavant à leur naissance dans l'anneau avoient été mises à l'aise par la dilatation que j'en avois faite. enfin le foyer du depôt s'est promptement detergé et reuni le Kiste a disparu en proportion et le blessé est sorti ~~de~~ de l'hôtel-Dieu au bout de 5 semaines parfaitement gueri.

Ne peut on pas regarder cet epanchement de serosités rassemblées dans un foyer dans le tissu cellulaire du cordon des vaisseaux spermatiques, comme une veritable hydrocelle

d'un genre aigu et parconsequent assés rare : il ne lui manquoit pour être parfaitement enkistée que de n'avoir aucune communication avec le depôt purulent et cette Communication étoit bien legere puisque les liquides contenus dans chacun de ses amas ne s'étoient presque pas mêlés et sans l'epanchement sanguin de la partie inferieure du scrotum on auroit pu distinguer aisement le testicule au dessous de cet amas de serosités : Cet hydrocele a été traité par ce qu'on appelle la grande operation qui consiste à fendre la tumeur et le Kiste dans toute leur longueur ; mais ce Kiste très recent n'a pas exigé pour sa destruction l'application des rougeans indispensables pour ceux qui sont anciens.

L'hydrocelle enkistée est une maladie fort commune dans les enfans du premier age et cependant peu connue de beaucoup de chirurgiens qui faute d'une attention suffisante la prennent souvent pour une hernie ou comme la plus part des Nourrices pour un pneumatocelle qu'elles appellent un vent : pneumatocelle qui je le crois n'existe que dans l'imagination et dont beaucoup d'auteurs ~~même~~ modernes parlent encore. L'erreur dont je viens de parler ne viendroit elle pas de ce que cette Maladie n'est bien decrite dans presque aucun de nos auteurs françois. parmi les Etrangers celui qui me paroist ~~l'~~avoir le mieux fait la description est M^r. Perrival Pot.

Si cette espece d'hydrocelle n'est pas rare dans les enfans naissans et si elle se dissipe aisement par des applications resolutives ; elle n'est peut être pas aussi Commune dans les enfans plus avancés en age et elle exige Certainement d'autres moyens ; Je veux dire qu'on doit evacuer l'eau epanchée. Je viens d'en

faire l'experience. Voici le fait.

Le fils d'un Notaire de mon voisinage, agé de bon 7 ans revint un jour de l'ecole en se plaignant d'une douleur aux parties Naturelles; ses parens l'examinerent et le crurent, comme l'on dit, rompu. Je fus appellé; d'après le coup d'oeil je pensai de même et je l'annonçai, mais le toucher et la reflexion me firent bientot changer d'opinion. la tumeur de forme allongée étoit d'un volume égal dans toute son étendue, on sentoit distinctement le testicule à sa partie inferieure elle ne rentroit point, on n'y sentoit à la verité point de fluctuation elle étoit trop tendue, mais l'enfant n'avoit aucun simptome d'un étranglement de l'intestin, accident d'ailleurs très rare à cet age. on ne sentoit pas le cordon spermatique vers l'anneau parceque la tumeur trop tendue pressoit fortement contre cette ouverture. cette tumeur ne ressembloit pas mal, à la vue et au toucher, à une vessie de poisson. ce ne pouvoit être qu'une hydrocele enkistée. Je dis en consequence que je m'étois d'abord trompé que ce n'étoit qu'un amas d'eau qui se dissiperoit.

trois semaines de repos et d'applications resolutives et la liberté du ventre entretenue pendant ce tems, comme le recommande Mr. Pott n'avoient pas fait diminuer la tumeur; Je donnai un coup de Lancette à sa partie inferieure au dessus du testicule, il en sortit au moins une cuillerée de liqueur de couleur très légérement citrine. le sac se resserra sur le champ, et remonta vers l'anneau en abandonnant le testicule à la partie inferieure du scrotum.

au bout de quelques jours d'applications de compresses trempées dans des liqueurs resolutives et fortifiantes, le sac me parut plus épais au toucher et plus allongé il me parut disposé à se remplir de nouveau. j'appliquai l'emplatre contra rupturam nouvellement fait; 15 jours d'application de cet emplatre ont effacé toute trace de la Maladie et terminé la cure que l'on peut croire radicale.

ne peut-on pas en effet d'après la simple evacuation du liquide enkisté compter sur une cure radicale à cet age si cette simple evacuation une ou plusieurs fois repettée suffit quelque fois, je pourrois même dire souvent, pour opérer la cure radicale de l'hydrocele de la tunique vaginale du testicule dans les adultes. Ma pratique m'authorise à penser ainsi puisque trois hydroceles que j'ai traitées par la simple ponction ont disparu sans autre secours.

Le Sujet de la premiere etoit un Sellier d'environ 50 ans qui depuis nombre d'années avoit un testicule skirreux, resté tel après plusieurs chaudepisses tombées comme l'on dit dans les bourses. il s'y joignit une hydrocele dont j'evacuai l'eau par la ponction et qui n'a point reparu depuis plus de 12 ans.

Le sujet de la seconde étoit un Cordonnier de 35 a 40 ans. il attribuoit son hydrocele à une difficulté d'uriner frequente qui plusieurs fois s'etoit changée en retention complette d'urine. la Maladie n'étoit point une hernie de vessie. je lui fis deux fois la ponction dans l'espace de 5 a 6 mois. il a eu des rechuttes de retention d'urine mais l'hydrocele n'a point reparu depuis plusieurs années. cet homme a cru en devoir la guerison à un suintement de serosités assez abondant qui s'est etabli pendant quelque tems, sans excoriation à la peau entre le Scrotum et la cuisse, dans le pli qui les separe.

Le Sujet de la 3e. observation est un Tailleur de 45 a 50 ans d'une santé très delicate. il ignoroit quelle pouvoit être la cause de son incommodité. je lui fis la ponction: il sortit environ une chopine de liquide de couleur de lie d'huile et a peu près de la même consistence. d'après ce que j'avois lu dans les auteurs je crus le testicule très malade, quoiqu'il me parut sain au toucher, après l'operation. Je craignis des accidens qui pourroient me forcer a fendre le scrotum

operation que je redoutois dans un Sujet d'une aussi faible constitution
J'en fus quitte pour la peur. je repettai la ponction au bout de quelques
mois et je tirai apeuprès la même quantité de liquide, mais moins
huileux et beaucoup moins foncé en Couleur. J'ai tiré moins de
liquide dans trois autres ponctions et il etoit clair et limpide. depuis
plus de deux ans Cette hydrocelle n'a point reparu

Ces observations ne m'authorisent elles pas a penser qu'on se decide
peut être legérement a tentes la cure radicale de l'hydrocelle par
l'incision. Opération souvent traversée d'accidens graves et
quelques fois même Mortels.

J'ai dit plus haut qu'on avoit souvent pris l'hydrocelle enkistée
des enfans pour le pretendu pneumatocelle ou pour un enterocelle
Je puis assurrer aussi que l'hydrocelle vaginale du Testicule a
quelquefois été meconnue par des chirurgiens d'ailleurs très instruits
etant Elève à Paris je fus chargé d'appliquer des Cataplasmes
sur une tumeur que portoit au Scrotum le Cocher de Mr. Le
Comte de Narbonne. Deux chirurgiens de reputation qui le
voyoient pensoient, je ne puis me rappeller sur quels Signes,
que c'etoit une hernie. plusieurs jours d'applications emollientes
n'avoient pas changé l'etat de la tumeur. Je l'examinai avec
attention; la limpidité de la liqueur Contenue et l'epaisseur peu
Considerable du Kiste me permirent en examinant la tumeur
entre une lumiere et moi, de reconnoitre l'hydrocelle.
le malade fit part de ma decouverte; on n'y crut pas ~~le malade~~
Il quitta son lit et fut trouver le frere Cosme qui lui fit la
ponction, qu'un des chirurgiens qui l'avoit vu d'abord repetta
depuis.